

HÜVELYPLASZTIKAI MŰTÉT

Beteg neve: _____ Születési dátum: _____

TAJ: _____ Orvos neve: _____

A hüvelyplasztikai műtét javallatát részben a süllyedésszerű betegségek és a vizelettartási nehézség, részben a nemi élet kényelmetlenségét okozó hüvely elváltozások képezik.

A beavatkozás célja: A műtét célja a megsüllyedt mellső (húgyhólyag és hólyagnyak alatti terület), vagy hátsó hüvelyfal (végbél közeli hüvelyfal), valamint a rosszul, vagy hegesen gyógyult régi gátrepedés helyreállítása. A vizeletvesztés hüvelyi műtéti megoldásának egyik típusa a mellső hüvelyplasztika.



A beavatkozás technikája: A műtét az alatóorvos által kiválasztott, Önnel egyeztetett érzéstelenítésben történik. Előkészítés (szeméremszövet leborotválása, beöntés, nyugtató adása) után műtőasztalon, az érzéstelenítés beálltát követően a szeméremtestet és a hüvelyt fertőtlenítő oldattal mossuk le, majd a húgyhólyagba katétert vezetünk fel. A hüvely mellső falán, a külső húgycsőnyílás alatt 1-2 cm-rel kezdve, hosszanti metszést ejtünk. A süllyedésnek megfelelő méretű hüvelyfalat preparálunk fel, majd a húgycsövet a környező kötőszövetbe vezetett öltéssel megemelve, megtámasztjuk azt. A hólyagot felpreparáljuk, öltéssel megemeljük, majd megfelelő méretű hüvelyfalat metszünk ki. A sebet öltésekkel egyesítjük. Hátsó hüvelyplasztika során a hátsó hüvelyfal és a gát felső szakaszán rombusz alakú metszést ejtünk, a hüvelyhám

részt eltávolítjuk. A sérvet a környező kötőszövetbe vezetett öltésekkel, illetve a kétoldali végbélemelő (levator) izom rostjainak egyesítésével elbuktatjuk. A hüvelyfal és a gát sebeit öltésekkel egyesítjük. Esetenként a hüvelybe géz csíkot helyezünk.

Műtét utáni történések: Folyadékot fogyasztani és enni csak teljesen éber állapotban szabad. A korai időszakban átmeneti fájdalom, hőemelkedés, vérzés jelentkezhet. A húgyhólyag katétert 2-3 nap múlva távolítjuk el. Panaszmertesség esetén 3-5 nap múlva bocsátjuk otthonába.

A beavatkozás veszélyei, lehetséges gyakoribb műtéti szövődmények: A szövődmények gyakoriságát emelhetik egyes betegségek, gyógyszereszedés, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, az előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát. Műtét alatti szövődmények: a fertőtlenítéshez, vagy az érzéstelenítéshez használt anyagokkal szemben túlérzékenységi reakció jelentkezhet. Nagyon ritkán sérülhet a húgycső, a húgyhólyag és a végbél. A sérülések ellátása (amennyiben felismerésre kerülnek) a műtét során megoldható. A műtét utáni korai időszakban jelentkező szövődmények: a műtétet követően átmeneti fájdalom, vizelési és székletürítési nehézség jelentkezhet. Ritkán előfordul utóvérzés, vérömleny, vérszegénység, sebgyógyulás, sebészérválás, húgyúti gyulladás is. Nagyobb vérvesztés esetén vérátömlesztés (transzfúzió) adása is szükségessé válhat. A műtét alatti fektetésből adódóan perifériás beidegzési zavar is jelentkezhet az alsó végtagokban. Műtét utáni késői időszakban jelentkező szövődmények: nagyon ritkán sipolyképződés a húgyhólyag, a húgycső és a hüvely, illetve a végbél és a hüvely között. A vizeletvesztési panasz és a hüvelyfal süllyedése később kiújulhat.

Teendők a beavatkozás után: Kontroll vizsgálatra a műtét után 6 héttel, panasz esetén azonnal jelentkezzen. Addig kímélő életmód javasolt, az ülőfürdő és a nemi élet tilalmával.

Alternatív megoldások: Fiatalabb korban speciális izomtorna, idősebb korban hüvelybe helyezhető segédeszközök (gyűrű, kocka) használata, gyógyszeres kezelés, illetve egyéb hüvelyi (szalag) műtétek.

A beavatkozás elmaradásának esetleges veszélyei: Hólyagsérv esetén a vizeletvesztési tünetek fokozódhatnak, a hólyagban pangó vizelet megfertőződhet, gennyvizelet alakulhat ki. Végbélsérv esetén székletürítési nehézség, deréktáji fájdalom jelentkezhet. Előfordulhat a hüvely (és a méh) teljes kifordulása is.



Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

Osztályvezető főorvos: **Dr. Belics Zorán PhD**

1204 Budapest, Köves út 1. Telefon: (06) 1 289 6323

A SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁST KIEGÉSZÍTŐ BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az erre kapott válaszok:

A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott: Dr. _____

KÉRELEM ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

A **HÜVELYPLASZTIKAI MŰTÉT** című tájékoztatót elolvastam, az orvos szóbeli tájékoztatását megértettem, az általam feltett kérdésekre kielégítő választ kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem és kérem annak elvégzését.

Budapest, _____ év, _____ hó, _____ nap, _____ óra, _____ perc

tájékoztatást végző orvos aláírása és pecsétje

beteg/törvényes képviselő aláírása

ELUTASÍTÓ NYILATKOZAT* A kezelőorvos részletes felvilágosítása ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom. Az ellátás visszautasítása miatt bekövetkező káros következményekért orvosaimat felelősségem nem terheli, és kötelezhető vagyok az ennek következtében felmerült költségek megtérítésére.

(Ha a beteg olyan beavatkozást utasít el, aminek elmaradása a saját, vagy a magzata életét veszélyezteti, vagy aránytalanul súlyos terhet, illetve maradandó károsodást okozhat, az elutasító nyilatkozatot két tanúnak az aláírásával is hitelesíteni kell).

Budapest, _____ év, _____ hó, _____ nap, _____ óra, _____ perc

tájékoztatást végző orvos aláírása és pecsétje

beteg/törvényes képviselő aláírása

1. sz. tanú aláírása

2. sz. tanú aláírása

*** Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 17. § (2):**

„A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások - ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is - egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti.”

Ezen betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat egy példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!