

PROSZATATA FELTÁRÁSOS MŰTÉTTel TÖRTÉNŐ TELJES ELTÁVOLÍTÁSA ROSSZINDULATÚ DAGANAT MIATT (RADIKÁLIS RETROPUBLICUS PROSTATECTOMIA)

Kedves betegünk!

Az Ön esetében a dűlmirigy (prosztata) rosszindulatú megbetegedése miatt tervezünk műtétet. A prosztata a húgyhólyag alatt helyezkedik el a húgycső körül, alatta található a hólyagzáróizom, melynek épsége biztosítja a vizelést és megakadályozza a vizeletcsepegést, akaratunktól független vizeletelfolyást.

Önnél előzőekben vérvizsgálat (PSA) és prosztata szövettani mintavétel történt, melynek eredménye igazolta a prosztata rosszindulatú megbetegedését. Az Ön esetében életkilátásai jók, általános állapota megfelelő, így a műtetre alkalmas. Csontizotóp vizsgálat és kismedencei képalkotó vizsgálat (MR) is történt, ezek eredményei azt igazolták, hogy a rosszindulatú folyamat csak a prosztatát érinti, a prosztatátok ép és a szervezetben daganatos terjedés (áttétképződés) nem igazolható. Ilyen esetben a végleges gyógyulás lehetőségét a műtét vagy a sugárkezelés jelentheti. A két kezelési lehetőség közül a műtét adja a jobb eredményt a végleges gyógyulás szempontjából (10 év múlva 100 betegből 15 beteggel több él műtét után, mint besugárzás után).

Hogy történik a beavatkozás?

Tervezett beavatkozás során a prosztata és az ondóhólyagok eltávolítása, és új kapcsolat (anasztomózis) létrehozása történik a húgyhólyag és a húgycső között. Ezen kívül a kismedencéből azon nyirokcsomók eltávolítása is szükséges lehet, amelyek az áttétképződés szempontjából elsődlegesek.

Műtét után 8-14 napig katétert kell viselni. A hasfalat a köldök és a szeméremcsont között metsszük be. Az eltávolított szervet és nyirokcsomókat szövettani vizsgálatra küldjük, hogy igazolni tudjuk a műtét előtti kivizsgálás eredményét. Amennyiben a szövettani vizsgálat azt igazolja, hogy a daganat csak a prosztata szöveti állományát érinti további kezelésre nincs szükség, csak ellenőrzésre kell járni. Sajnos a műtét előtti vizsgálatok alulértékelhetik a daganat kiterjedését, mintegy 20 %-ban és a műtét után további kezeléseket kell végeznünk (hormonterápia, besugárzás).

Milyen szövődmények léphetnek fel a műtét során és azt követően?

A legnagyobb óvatosság és körültekintés mellett is előfordulhatnak szövődmények a műtét alatt, illetve utána. Melyek ezek?

Minden orvosi beavatkozás során szövődmények léphetnek fel, ezeket két részre oszthatjuk.

Műtét alatt, és közvetlenül a műtét után fellépő szövődmények:

1. Műtéti halálozás (1-2 %)
2. Jelentős vérvesztés, mely vérkészítmény adását igényli (2-25%)
3. Végbelsősérülés, mely akár átmenetileg a vastagbél hasfalra történő kiültetését is jelentheti
4. Amennyiben a műtét előtti kivizsgálás jelentősen alulértékelt a prosztatadaganat kiterjedését, a prosztata eltávolítása el is maradhat

Műtét után fellépő szövődmények:

1. Kialakulhat vizeletcsorgás, nyirokcsorgás a sebből
2. A mozgás elmaradása miatt a lábon vérrögképződés léphet fel, ennek elszabadulása esetén tüdőembólia alakulhat ki (műtét előtt és után ezért véralvadást gátló injekciót kap, befászlizzuk a lábait)
3. Műtét közben sérülhet a kétoldali húgyvezeték, melynek megoldására ismételt kisebb műtétre lehet szükség
4. Sebgyógyulási zavar, sebgyógyulás alakulhat ki
5. Vérmérgezés, lázas állapot léphet fel
6. Műtét után vérzés is kialakulhat

Műtétből való felgyógyulás után fellépő szövődménylehetőségek (késői szövődmények):

1. Megtermékenyítő képtelenség (100%)
2. Impotencia, merevedési zavar (80 %)
3. Enyhefokú vizelettartási zavar, vizeletcsepegés, mely átmeneti is lehet
4. Súlyos fokú vizelettartási zavar, vizeletelfolyás (5%)
5. Húgycsőszűkület, melyet további műtéttel tudunk megoldani.

További felmerülő kérdések:

A műtét felvilágosítás során minden Önt érintő kérdést, amire addig nem kapott választ tegyen fel orvosának!

Pl.:

Mennyire szükséges és sürgős a műtét?

Fennáll-e valamilyen személy szerint Önt érintő szövődmény veszélye?

Milyen előzetes vizsgálatok szükségesek még a műtéthez? Ezek milyen szövődményekkel járhatnak?

Meddig tart előreláthatólag az intézeti kezelés?

Műtét után meddig kell a nemi élettől tartózkodnia?