

Betegtájékoztató

Tisztelt Betegünk!

A beavatkozáshoz, amelyet tervezünk, szükséges a beleegyezése. Ahhoz, hogy dönteni tudjon, az alábbi ismertetéssel szeretnénk segítségére lenni a betegségéről, valamint a beavatkozás módjáról, jelentőségéről, következményeiről és a lehetséges szövődményekről.

A betegség

A hasfali sérv az izmos hasfal valamely pontjának veleszületett vagy szerzett hiánya, melyen át a hashártya, mint egy zsák előboltosul (sérvtömlő). Ebbe a zsákba különböző zsigeri szervek juthatnak (sérvtartalom), melyek az eredeti helyzetükbe visszajuthatnak (reponabilis sérv). Egyes esetekben azonban nem jutnak vissza a hasüregbe (irreponabilis sérv), melynek oka lehet kinövés, kitapadás, illetve a sérvtartalom kizáródása is.

A betegség veszélyei és a kezelés lehetőségei

Sérvkizáródás esetén a sérvtartalom vérellátása zavart szenvedhet, a szövetek elhalhatnak, szervátfűródás, illetve fertőzéses, gyulladásszerű állapotok alakulhatnak ki. Ha a kizáródott szerv valamely bélszakasz, bélelzáródás tünetei alakulhatnak ki. Ez az állapot a legtöbb esetben sürgős műtétet igényel, mely során szükségessé válhat a károsodott szervek részleges eltávolítása is. Amennyiben a sérvkizáródás műfogásokkal megszüntethető akkor is javasolt a sérv későbbi műtéti megoldása.

Ha Ön úgy dönt, hogy nem egyezik bele a műtétbe, panaszai fokozódhatnak, sérve növekedhet, illetve kizáródhat.

Kezelési lehetőség

Sérvet véglegesen csak sebészi módszerrel lehet gyógyítani. Alternatív kezelési módként sérvkötő, illetve haskötő hordása jön szóba.

Műtéti beavatkozás

A műtétet gerincvelői érzéstelenítésben, vagy altatásban végezzük. Ennek módját az altatóorvos kollégával beszélte meg korábban a műtét előtti aneszteziológiai vizsgálat során.

A műtét során hasi metszésből tárjuk fel a műtéti területet. A sérv felkeresését követően a sérv kapuját, melyen keresztül a korábban leírt sérvtartalom előboltosul, sebészi öltésekkel zárjuk, valamint szükség szerint műanyag háló beültetésével erősítjük meg ezen a területen hasfalát.


Amennyiben azt a műtéti helyzet igényli, a műtét végén a műtéti területre a hasfalra ejtett kis metszésen keresztül műanyag csövet vezetünk az esetlegesen termelődő savó, illetve vér elvezetése céljából.

Köldöksérv műtét esetén a sérv nagyságától, a köldök bőrének korábbi elvékonyodásától függően szükség lehet a műtét során a bőrköldök eltávolítására, melyet operáló orvosa külön megbeszél Önnél a műtét előtt.

A technika fejlődése lehetővé tette, hogy a hasfali sérvműtétet bizonyos esetekben úgynevezett “laparoszkópos” módszerrel végezzük el, mely során néhány cm-es metszéseket ejtve vezetjük be a szükséges műszereket és videó rendszer segítségével végezzük el a beavatkozást.

- Ennek előnyei
- a kisebb műtéti megterhelés,
 - a rövidebb kórházi tartózkodás és gyógyulási időszak,
 - a kevesebb fájdalom,
 - a jobb kozmetikai eredmény.

Az Ön számára legkedvezőbb műtéti megoldást kezelőorvosa fogja javasolni.



Lehetséges szövődmények

Az általános műtéti szövődmények mellett a beavatkozás lehetséges műtéti szövődményei: hasüregi vagy kismedencei szerv sérülése, hasfali, combi idegbántalom, idegen test visszamaradása, háló kilökődése, bélműködési zavar.

Mint minden sebészeti beavatkozás után, ritkán a sérvműtétet követően is szükségessé válhat az esetlegesen fellépő szövődmények ellátása céljából ismételt műtét végzésére.

A műtét körüli időszak jellemzői

A beavatkozás előtt:

Az operáló orvos meghatározza, hogy az otthonában esetlegesen szedett véralvadásgátló gyógyszereket (pl. Syncumar, Aspirin) szüneteltesse, illetve helyette milyen más gyógyszert - leggyakrabban a bőr alá beadott kismolekula súlyú heparin injekciót - állítsunk be.

A beavatkozás után:

- a műtétet követően infúzióban folyadékpótlást kap, fájdalmát csillapítjuk, pulzusát, vérnyomását rendszeresen ellenőrizzük, illetve esetleges egyéb kísérőbetegségei további ellenőrzéseket tehetnek szükségessé.
- a műtét napján este segítséggel felkelhet.
- ha általános állapota engedi, a műtét másnapján otthonába bocsátjuk.
- a varratokat/kapcsokat a műtét utáni 7-9. napon távolítjuk el.
- tusolni a varratszedés után azonnal szabad, tartósabb vízben tartózkodás (fürdés, úszás) csak 2-3 hét múlva, a seb teljes gyógyulását követően javasolt.

Beszélje meg kezelőorvosával a szükséges további teendőket!

Gyógyulási kilátások

A hasfali sérvműtét gyógyulási eredménye nagyon jó, kicsi a műtéti kockázat, nem változtatja meg az operált aktivitását, munkaképességét.

Általában a műtétet követő napon betegeinket otthonába bocsátjuk, a műtét előtti aktivitás visszatérése 2-3 hét múlva várható. Mindezeket természetesen kísérő betegségeinek megléte, az esetleges szövődmények, a beteg állapota és munkaköre befolyásolhatják.