

BETEGTÁJÉKOZTATÓ
A KÚSZÓHÁRTYA, VAGY PTERYGIUM

Kedves Betegünk!

A szemgolyó elülső felszínét a szaruhártya és a kötőhártya borítja. Normális esetben a kötőhártya a szaruhártya határánál véget ér (ezt a területet limbusnak nevezzük).

A kúszóhártya az orr felőli oldalról kiinduló fehéres, ereket tartalmazó kötőhártya-kettőzet, amely az anatómiai határokat nem tartja be, azaz átlépi a kötőhártya-szaruhártya határt. A kettőzet szaruhártya centruma felé halad, ha eléri a pupilla területét, a látást jelentősen rontja. Kialakulásában fontos tényező a napsütéses órák száma és a poros környezet. Kezdetben nem okoz panaszokat, időnként szemvörösséget okoz, amely fájdalmat nem, csupán kozmetikai problémát jelent. Ha a látást is rontja, illetve a beteget kifejezetten zavarja, akkor a megoldása sebészi kimetszés. Az eltávolítás során a kettőzetet lefejtik a szaruhártyáról, kivágnak, majd a sebet zárják. A varratok rendszerint felszívódnak, eltávolításra nincs szükség. A műtét során a szemgolyó nem kerül megnyitásra, látásromlás nem történik. A műtét után a szaruhártyán egy kis seb marad a kettőzet helyén, ami szúró érzést okoz, ennek gyógyulása 2-3 napot vesz igénybe. A sebészi eltávolítás után kiújulásra hajlamos.

A műtét során előforduló legsúlyosabb de rendkívül ritka szövődmény a szemgolyó átszűrődése, amely általában varrattal történő zárást igényel. A műtét után előforduló komplikációk: varratelégtelenség, gyulladás, szemhéj-vörösség, a szem elülső részének keringési elégtelensége. Kiújulás esetén az újabb műtét alapos megfontolást igényel, mert a kiújulási hajlam minden műtét után egyre nő.

További felmerülő kérdések:

E betegség- és gyógykezelési ismertető nyomán Önnek még számos kérdése merülhet fel. Kérjük, minden Önt érintő, érdeklő kérdést tegyen fel orvosának!

Ilyen kérdés lehet például:

- Mennyire szükséges és sürgős a kezelés?
- Fennáll-e valamilyen személy szerint Önt érintő szövődmény veszélye?
- Milyen előzetes vizsgálatok szükségesek még a kezeléshez? Ezek milyen szövődményekkel járhatnak?
- Meddig tart előreláthatólag az intézeti kezelés?
- Személyes életvitele változik-e a műtét után, végezhet-e fizikai munkát?